

Historique des anomalies constatées : disparition des butineuses, mortalité de nymphes...

Jeudi 29.04 : constat perte de butineuses - rucher John Besnard, à Villebramar (présence de J. Besnard, M. Coudoin)

Vendredi 30.04 : mortalité de nymphes devant les ruches, à Verteuil (D. Goirand, apiculteur)
Informe : Mme Jacqueline Gastal (Présidente du syndicat départemental Abeille Gasconne).

Samedi 01.05 : mortalité de nymphes devant ses ruches à Tombeboeuf et Verteuil (M. Coudoin)
Informe : Mme Jacqueline Gastal, M. Pierre Lienard - GDSA 47, M. Frank Alétru (Vice-président Terre d'Abeilles)

Contacte : M. Gérard VENEREAU, Inspecteur Brigade Nationale d'Enquêtes vétérinaires et phytosanitaires.

M. J.F. Fage (apiculteur) constate et signale le même problème sur deux de ses ruchers, sur la même zone...

Dimanche 02.05 : visite ruchers D. Goirand et M. Coudoin avec M. Raymond Bernadet (agent sanitaire apicole)...

Mardi 04.05 : en présence de M. Pierre Lienard, j'informe le directeur de la DSV 47, qui détache M. Berthoumieux sur le terrain le jour même.

Vendredi 07.05 : constat, prélèvements sur 4 ruchers appartenant à Ms. Goirand, Fage, Coudoin...

Intervenants sur site : Mme M.P. Chauzat - AFSSA, Ms. Meziani et M. Berthoumieux - DSV 47
Apiculteurs présents : Mme J. Gastal, Ms. Lienard, Goirand, Fage, Coudoin...

Dimanche 09.05 : mêmes constats : perte des butineuses + mortalité de nymphes, sur 3 ruchers Gastal - ce qui agrandit la zone vers le nord...

Apiculteurs présents: M. Dimitri Crabeil, également victime, M. Bertrand Auzeral...

Autres constats : Secteur de La Sauvetat du Dropt (M. Siron)
Secteur de Sainte-Livrade (M. Mercier, vétérinaire)...

Remarques : La zone principale touchée forme un quadrilatère de 20 / 15 Km...
Les ruchers déplacés en début de la floraison du colza perdent beaucoup plus de butineuses.
Les ruches ont réussi à remplir deux hausses avant la disparition des butineuses...

Traitements effectués sur colza :

- Un insecticide (Karaté K) a été appliqué au début de la floraison...
- Deux traitements fongicides ont été effectués en cours de floraison (mi-floraison, fin floraison)
- De très nombreux traitements ont été effectués en pleine journée, par forte chaleur, en pleine floraison.

Au cours des prélèvements effectués sur le rucher Fage à Labretonie, Mme M.P. Chauzat (AFSSA) déclare : « *Nous sommes en présence d'un phénomène nouveau, jamais observé jusqu'à présent ; vraisemblablement dû à l'intervention d'un agent extérieur à la ruche* »...